



ANNEXE 3

FICHE DE SYNTHÈSE

Phase 3 : Actualisation du plan d'action et des mesures de gestion

Révision du profil de baignade du plan d'eau du Canada – Ville de Beauvais



Profil de baignade du plan d'eau du Canada (Beauvais)

Date d'élaboration du profil : Mars 2012 – Révision en 2019


Caractéristiques de la baignade

Nom de la baignade : Beauvais-plan d'eau du Canada
 Commune : Beauvais
 Département : Oise (60)
 Région : Picardie
 Personne responsable de l'eau de baignade : Mathilde GOUJON, Responsable Service Plan d'Eau du Canada
 Période d'ouverture : tous les jours en juillet et août

- Du lundi au vendredi de 13h30 à 19h30
- Les week-end et jours fériés de 11h30 à 19h30

Fréquentation maximale journalière pendant la saison balnéaire : 800 à 1600 personnes

Schéma de la zone de baignade



Historique de la qualité de l'eau de baignade

Qualité de l'eau de baignade au cours des 7 dernières années

Année	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Classement	Exc.	Exc.	Exc.	Exc.	Exc.	Bonne	Exc.

Exc. = excellente

Carte de la zone d'étude



Inventaire des sources de pollution et mesures de gestion						
Diagnostic			Gestion préventive des pollutions			Plan d'actions
Principales sources de pollution inventoriées	Impact	Distance de la plage	Indicateurs suivis et seuils d'alerte	Procédures	Mesures de gestion	Mesures de réduction
Oiseaux	Significatif	immédiate	[<i>E. coli</i> /100ml] >1800	Sollicitation du responsable de la plage	Interdiction de baignade et information du public si dépassement des seuils	Ramasser les déchets
Bassin versant	Significatif	importante	[<i>E. coli</i> /100ml] >1800 ou [Entérocoques/100ml] >660			Investigations pour préciser la problématique
Baigneurs	Significatif	immédiate	[<i>E. coli</i> /100ml] >1800 ou [Entérocoques/100ml] >660 ou [staphylocoques/100ml] > 20 ou [<i>pseudomonas</i> /100ml] > 10			Améliorer la recirculation des eaux en augmentant la puissance de pompage et en éloignant la prise d'eau
Cyano-bactéries	Faible	immédiate	Nb de cyano>100 000 /ml OU équivalent microcystine-LR > 25 µg/l			Enlever les macrophytes morts Pas de faucardage intense (uniquement les parties supérieures)